

【EC療法について】 (エピルピシン+エンドキサン)

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
薬の名前	作用	時間																								
デキサート注	吐き気止め	30分																								
アロカリス注	吐き気止め																									
パロノセトロン注	吐き気止め																									
エピルピシン注	抗がん剤	2~5分		尿が赤くなることがあります											この週はお休みです。						この週はお休みです。					
エンドキサン注	抗がん剤	30分																								
シーラスタ注	白血球減少予防	皮下注射																								
ネキシウムカプセル	胃薬	朝 内服																								
ナウゼリンOD錠	吐き気止め	朝・昼・夕 内服																								
ジブレキサ錠	吐き気止め	夕 内服																								
酸化マグネシウム錠	便秘予防	朝・昼・夕 内服																								

治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
吐き気																								
白血球減少																								
脱毛																								

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。