








































【dose-dense パクリタキセル療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7		
薬の名前	作用	時間																							
レスタミン錠	アレルギー予防	点滴前 内服	 5錠															 5錠							
ファモチジン注	アレルギー予防	10分																							
デキサート注	アレルギー予防、吐き気止め																								
グラニセトロン注	吐き気止め																								
パクリタキセル注	抗がん剤	180分																							
ジーラスタ注	白血球減少予防	皮下注射																							
ハクタ錠	肺炎予防	朝 内服																							

治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	2	3	4	5	6	7	
アレルギー																							
筋肉痛・関節痛																							
皮疹（皮膚炎、湿疹、あかざれ）																							
白血球減少																							
脱毛																							

 : 出現時期

末梢神経障害（治療回数が増えると生じることがあります。しびれ感などがありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。