

















【ドセタキセル療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用	時間																							
レスタミン錠	アレルギー予防	点滴前 内服	 5錠																						
デキサート注	アレルギー予防、 吐き気止め	30分								 この週は お休みです。								 この週は お休みです。							
グラニセトロン注																									
ドセタキセル注	抗がん剤	60分 (初回120分)																							
シーラスタ注	白血球減少予防	皮下注射																							

治療による副作用

 : 出現時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
アレルギー																							
皮疹（皮膚炎、湿疹、あかざれ）																							
筋肉痛・関節痛																							
白血球減少																							
脱毛																							

末梢神経障害（治療回数が増えると生じることがあります。しびれ感などがありましたらお知らせ下さい。）

手や足のむくみ（治療回数が増えると生じることがあります。気になる症状がありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。