




【フェスゴ療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

| 薬の名前 | 作用 | 時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | |
|-------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェスゴ注 | 抗がん剤 | 5分 (初回8分) |  | | | | | | | |  | この週はお休みです。 | | | | | | | | | | | | |  |

治療による副作用

| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|
| 皮疹（皮膚炎、湿疹、あかざれ） | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下痢 | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 悪寒・発熱 | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

心機能低下（治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。）

注射をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。