













【パクリタキセル+ベバシズマブ療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)












薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
レスタミン錠	アレルギー予防	点滴前 内服	 5錠							 5錠																							
ファモチジン注	アレルギー予防	10分																															
デキサート注	アレルギー予防、吐き気止め																																
パクリタキセル注	抗がん剤	60分 (初回120分)																															
ベバシズマブ	抗がん剤	90分																															



この週はお休みです。

投与時間は、2回目は60分、3回目以降は30分で行う予定です

治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
アレルギー																															
筋肉痛・関節痛																															
皮疹 (皮膚炎、湿疹、あかぎれ)																															
末梢神経障害 (しびれ)																															
白血球減少																															
脱毛																															

高血圧 (治療回数が増えると生じることがあります。自宅で血圧測定を行い、受診時に医師にお知らせ下さい。)

鼻出血 (治療回数が増えると生じることがあります。出血が治まらない場合はお知らせ下さい。)

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。