












# 【エンハーツ療法について】

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目			
薬の名前	作用	時間																									
デキサート注	吐き気止め	30分																									
アロカリス注	吐き気止め																										
パロノセトロン注	吐き気止め																										
エンハーツ注	抗がん剤	90分																									
ナウゼリンOD錠	吐き気止め	朝・昼・夕 内服																									
																											

## 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
悪寒・発熱																								
吐き気																								
白血球減少																								
脱毛																								

心機能低下（治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。）

間質性肺疾患（咳（乾いた咳）、息切れ、息苦しさ、発熱などがありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。