

## 【ダトロウェイ療法について】

**お薬の名前と治療のスケジュール**（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
薬の名前	作用	時間																							
カロナール錠	アレルギー予防	点滴前 内服																							
デキサート注	吐き気止め	15分																							
パロノセトロン注	吐き気止め																								
ボララミン注	アレルギー予防																								
ダトロウェイ注	抗がん剤	30分 (初回90分)																							
ナウゼリンOD錠	吐き気止め	朝・昼・夕 内服																							

この週はお休みです。

この週はお休みです。

3日目以降は吐き気がなければ中止

### 治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目		
インフュージョンリアクション (咳、息苦しさ、痒み、発疹、血圧低下など)																								
吐き気																								
角膜障害 (ドライアイ、流涙増加、羞明、視力低下など)																								
口内炎																								
白血球減少																								
脱毛																								

■ : 出現時期

間質性肺疾患（咳（乾いた咳）、息切れ、息苦しさ、発熱などがありましたらお知らせ下さい。）

点滴をした日は、自動車、バイクなどの運転はお控えください。

当院は、一部の薬剤にジェネリック医薬品及びバイオシミラーを使用しています。