



# 大腸がん


## Cape療法




## CAPOX療法




## CAPOX + BV療法




## IRIS (S-1+CPT-11)療法 (4週)



## IRIS (S-1+CPT-11)療法 (3週)



## IRIS + BV療法 (4週)



## IRIS+BV療法(3週)

			Day 1	8	15	22	29	36
<b>BV</b> (ペバシツマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	↓			↓		
<b>CPT-11</b> (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓			↓		
<b>S-1</b>	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回経口	→			→		
			1コース目(3週間)			2コース目		

## mFOLFOX6

			Day 1	8	15	22
<b>L-OHP</b> (オキサリプラチン)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
<b>Q-LV</b> (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
<b>5-FU</b>	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	↓		↓	
<b>5-FU</b>	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	→ (約46時間)			→
			1コース目(2週間)			2コース目

## mFOLFOX6 + BV療法

			Day 1	8	15	22
BV (ペバシツマブ)	5mg/kg	点滴静注	↓		↓	
L-OHP (オキサリプラチン)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	→ (約46時間)		→	
			1コース目 (2週間)			2コース目


## FOLFILI + BV療法

			Day 1	8	15	22
BV (ペバシツマブ)	5mg/kg	点滴静注	↓		↓	
CPT-11 (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	→ (約46時間)		→	
			1コース目 (2週間)			2コース目

## Panitumumabu療法

			Day 1	8	15	22
Pmab (パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	↓		↓	
			1コース目 (2週間)			2コース目

## Trifluridine/Tipiracil(ロンサーフ) + BV療法(4週)



## Pertuzumab + Trastuzumab療法(3週)

