



大腸がん


Cape療法




CAPOX療法




CAPOX+BV療法




IRIS (S-1+CPT-11) 療法 (4週)



IRIS (S-1+CPT-11) 療法 (3週)



IRIS+BV療法 (4週)



IRIS+BV療法(3週)

			Day 1	8	15	22	29	36
BV (ペナビシツマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	↓			↓		
CPT-11 (イリノテカン)	150mg/m ²	点滴静注	↓			↓		
S-1	80mg/m ² /day	1日2回経口	→			→		
			1コース目(3週間)			2コース目		

mFOLFOX6

			Day 1	8	15	22
L-OHP (オキサリプラチン)	85mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	→ (約46時間)			→
			1コース目(2週間)			2コース目

mFOLFOX6＋BV療法

			Day 1	8	15	22
BV (ベバシヅマブ)	5mg/kg	点滴静注	↓		↓	
L-OHP (オキサリプラチン)	85mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	→ (約46時間)			→
			1コース目 (2週間)			2コース目

FOLFILI＋BV療法

			Day 1	8	15	22
BV (ベバシヅマブ)	5mg/kg	点滴静注	↓		↓	
CPT-11 (イリノテカン)	150mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	→ (約46時間)			→
			1コース目 (2週間)			2コース目

Panitumumabu療法

			Day 1	8	15	22
Pmab (パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	↓		↓	
			1コース目 (2週間)			2コース目

mFOLFOX6＋Pmab療法

			Day 1	8	15	22
Pmab (パニツムマブ)	6mg/kg	点滴静注	↓		↓	
L-OHP (オキサリプラチン)	85mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	(約46時間)→		→	
			1コース目(2週間)			2コース目

FOLFILI＋Pmab療法

			Day 1	8	15	22
Pmab (パニツムマブ)	3mg/kg	点滴静注	↓		↓	
CPT-11 (イリノテカン)	150mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
ℓ-LV (レボホリナート)	200mg/m ²	点滴静注	↓		↓	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	↓		↓	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	(約46時間)→		→	
			1コース目(2週間)			2コース目

Trifluridine/Tipiracil(ロンサーフ)＋BV療法(4週)

			Day 1	8	15	22	29	36
BV (ペバシツマブ)	5mg/kg	点滴静注	↓		↓		↓	
チピラシル トリフルリジン	35mg/m ² /day	1日2回経口	→	→			→	→
			1コース目(4週間)				2コース目	

Pertuzumab＋Trastuzumab療法(3週)

			Day 1	8	15	22	29	36
ペルツズマブ	初回 2回目以降	820mg 420mg 点滴静注	↓			↓		
トラスツズマブ	初回 2回目以降	8mg/kg 6mg/kg 点滴静注	↓			↓		
			1コース目(3週間)				2コース目	